

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DE BOURGOGNE

ABONNEMENT ANNUEL : 60 F.

ET FRANCHE-COMTÉ - COTE-D'OR - SAONE-ET-LOIRE - YONNE - NIÈVRE - JURA - DOUBS - HAUTE-SAONE - TERRITOIRE DE BELFORT

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Z.I. NORD - B.P. 194 - 21206 BEAUNE CEDEX - Tél. (80) 22.19.38

Régisseur de recettes de la Direction Départementale de l'Agriculture - C.C.P. DIJON 3405.12 K

Bulletin n° 19 - 8 juillet 1982

Edition "GRANDES CULTURES"

M A I S

PYRALE

Depuis notre précédent bulletin, le vol suivi à l'aide de pièges sexuels s'est intensifié, surtout dans le département de l'YONNE.

Les contrôles de ponte effectués au cours de la semaine précédente donnent les indications suivantes :

Dépôts de pontes localement importants (jusqu'à 25-30 % de pieds ayant 1 ponte) dans le nord de l'YONNE (Sénonais) et à un degré moindre dans les deux autres régions de ce département (Jovignien et Tonnerrois) ainsi que dans le JURA (Val de Seille et Val d'Amour).

Pour les autres secteurs de la Circonscription les dépôts de pontes sont actuellement peu importants.

Les conditions météorologiques demeurent favorables aux cultures de maïs (temps chaud et une période pluvieuse du 3 au 4/07 de l'ordre de 20 à 30 mm) dont la végétation évolue rapidement.

La période optimale d'intervention se situe lorsque les panicules males sont visibles au fond du cornet de 50 % des plantes (rétention maximale des granulés). Comme nous l'avons indiqué dans le bulletin précédent, faire les traitements en fonction des stades du maïs et attendre le stade fin de cornet pour intervenir. Eviter les applications sur des parcelles ayant largement dépassé le stade optimal (les panicules males bien étalées au-dessus des pieds, empêchent la localisation des granulés à la base des feuilles).

Pour le choix des produits, se reporter aux bulletins précédents n° 14, 17 et 18. Seules les formulations microgranulés sont autorisées à la vente contre ce ravageur.

PUCERONS : Les populations de pucerons dans les cultures de maïs restent à des niveaux bas. Maintenir la surveillance de ce ravageur.

P O I S

TORDEUSE : Compte tenu du stade des cultures, toute intervention contre ce ravageur est déconseillée.

POMME DE TERRE

MILDIOU : Les pluies importantes des 3-4 juillet ont lessivé le dernier traitement. Prévoir le renouvellement de la protection.

*
* *

Pd3